



ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ
เรื่อง การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาล

ด้วย ปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ได้มีการระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงในพื้นที่เทศบาลตำบลเพ็ญ เพื่อเป็นการ ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเพ็ญ และบริเวณใกล้เคียง เทศบาลจึงให้มีการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ตัวแก่ซึ่งเป็นพาหะนำโรคตามกำหนดการ ในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีแผนปฏิบัติงาน ดังนี้

วัน เดือน ปี	พื้นที่ดำเนินการ	กิจกรรมที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าตอง	ช่วงเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ๑. พ่นหมอกควัน ๒. แจกทรายอะเบท ๓. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง	
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	หมู่ที่ ๑ บ้านเพ็ญ		
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะแก้ว		
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘	หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีสว่างวงศ์		
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าสูง		

ดังนั้น จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญและบริเวณใกล้เคียงทราบรายละเอียดตามวันและเวลา ดังกล่าวได้เตรียมความพร้อม โดยการปิดภาชนะใส่อาหาร น้ำอุปโภคบริโภค ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยง ให้ออกห่างจากรั้วมีของหมอกควันกำจัดยุง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชัยภัทรภูย์ นามโคตร)
นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

๑. การพ่นหมอกควัน

การพ่นหมอกควัน จะใช้ความร้อนช่วยในการแตกตัวของน้ำยาออกเป็นละอองเม็ดเล็ก ๆ เมื่อสารเคมีแตกตัวจะ ถูกแรงลมเป่าทำให้ฟุ้งกระจายในรูปหมอกควัน ขนาดเม็ดน้ำยา (Droplets) มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๑๐ - ๖๐ ไมครอน (สำนักงานควบคุมโรคใช้เล็ดออก, ๒๕๔๔ หน้า ๑๐๑) วิธีการพ่นหมอกควัน จะกำจัดยุงได้ดีนั้นจะต้องปิดอบควันในบ้านอย่าง น้อย ๓๐ นาที คนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิดต้องออกมาอยู่นอกบ้าน และควรเก็บเสื้อผ้า อาหาร ให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับ สารเคมีเครื่องพ่นหมอกควัน มีทั้งแบบดีรยอนต์และแบบหัว ซึ่งทางเทศบาลเพ็ญไชยอยู่เป็นแบบหัว

***การปฏิบัติของประชาชนในการพ่นสารเคมี

๑. ปิดประตู/หน้าต่างบ้าน ในขณะที่เจ้าหน้าที่พ่นฯ เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมี
๒. ประชาชนต้องปกปิดอาหาร และภาชนะใส่อาหารให้มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อน
๓. เก็บเสื้อผ้า ข้าวของที่ไม่ต้องการให้ถูกสารเคมีให้มิดชิด
๔. งดออกมานอกตัวบ้านในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพ่นสารเคมีและให้ผู้ปกครองเตือนบุตรหลานไม่ให้ตามเล่น ละอองที่พ่นออกมา เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมี
๕. สัตว์เลี้ยงที่ไม่มีกระดูกสัน เช่น กุ้ง ปู จิ้งหรีด แมลงต่างๆ เป็นต้น ควรหาที่เก็บให้มิดชิด เพราะสารเคมีที่ใช้พ่น มีผลกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังโดยตรง
๖. ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ภาชนะเหลือทิ้งในบริเวณรอบๆบ้านที่พักอาศัย

หมายเหตุ :

๑. การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย มีประสิทธิภาพลดความหนาแน่นของยุงได้ประมาณ ๓- ๕ วันเท่านั้น และ การพ่นสารเคมีบ่อยๆ โดยไม่จำเป็นจะทำให้ยุงดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อการควบคุมการระบาดของ โรค
๒. ขอความร่วมมือประชาชนในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเองโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นวิธี ตัดวงจรการเกิดยุง และเป็นวิธีการป้องกันโรคใช้เล็ดออกที่ดีที่สุด