



ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ
เรื่อง การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาล

ด้วย ปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ได้มีการระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อเป็นการ ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเพ็ญ และบริเวณใกล้เคียง เทศบาลตำบลเพ็ญ จึงได้มีการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ตามกำหนดการ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีแผนปฏิบัติงาน ดังนี้

| วัน เดือน ปี | พื้นที่ดำเนินการ | กิจกรรมที่ปฏิบัติ | หมายเหตุ |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ | บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ | ช่วงเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. | |
| ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ | บ้านเพ็ญ หมู่ที่ ๑ | ๑. พ่นหมอกควัน | |
| ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ | บ้านศรีสว่างวงศ์ หมู่ที่ ๑๕ | ๒. แจกทรายอะเบท | |
| ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ | บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ | ๓. แจกแผ่นพับความรู้ป้องกันโรค | |
| ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ | บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ ๘ | ๔. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง | |

ดังนั้น จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญและบริเวณใกล้เคียงทราบ รายละเอียดตามวันและเวลาดังกล่าว ให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม โดยการปิดภาชนะใส่อาหาร น้ำอุปโภค-บริโภค ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยง ให้ออกห่างจากรัศมีของหมอกควันกำจัดยุงฯ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายชัยภัทรภูย์ นามโคตร)
นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

การพ่นหมอกควัน

การพ่นหมอกควัน จะใช้ความร้อนช่วยในการแตกตัวของน้ำยาออกเป็นละอองเม็ดเล็ก ๆ เมื่อสารเคมีแตกตัวจะ ถูกแรงลมเป่าทำให้ฟุ้งกระจายในรูปหมอกควัน ขนาดเม็ดน้ำยา (Droplets) มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๑๐ - ๖๐ ไมครอน (สำนักงานควบคุมโรคใช้เลือดออก, ๒๕๔๔ หน้า ๑๐๑) วิธีการพ่นหมอกควัน จะกำจัดยุงได้ดีนั้นจะต้องปิดอบควันในบ้านอย่าง น้อย ๓๐ นาที คนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิดต้องออกมาอยู่นอกบ้าน และควรเก็บเสื้อผ้า อาหาร ให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับ สารเคมีเครื่องพ่นหมอกควัน มีทั้งแบบติตรอยนต์และแบบหัว ซึ่งทางเทศบาลเพ็ญไชยอยู่เป็นแบบหัว

การปฏิบัติของประชาชนในการพ่นสารเคมี

๑. ปิดประตู/หน้าต่างบ้าน ในขณะที่เจ้าหน้าที่พ่นฯ เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมี
๒. ประชาชนต้องปกปิดอาหาร และภาชนะใส่อาหารให้มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อน
๓. เก็บเสื้อผ้า ข้าวของที่ไม่ต้องการให้ถูกสารเคมีให้มิดชิด
๔. งดออกมานอกตัวบ้านในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพ่นสารเคมีและให้ผู้ปกครองเตือนบุตรหลานไม่ให้ตามเล่น ละอองที่พ่นออกมา เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมี
๕. สัตว์เลี้ยงที่ไม่มีกระดูกสัน เช่น กุ้ง ปู จิ้งหรีด แมลงต่างๆ เป็นต้น ควรหาที่เก็บให้มิดชิด เพราะสารเคมีที่ใช้พ่น มีผลกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังโดยตรง
๖. ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ภาชนะเหลือทิ้งในบริเวณรอบๆบ้านที่พักอาศัย

หมายเหตุ :

๑. การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย มีประสิทธิภาพลดความหนาแน่นของยุงได้ประมาณ ๓ - ๕ วันเท่านั้น และ การพ่นสารเคมีบ่อยๆ โดยไม่จำเป็นจะทำให้ยุงดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อการควบคุมการระบาดของ โรค
๒. ขอความร่วมมือประชาชนในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเองโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นวิธี ตัดวงจรการเกิดของยุง และเป็นวิธีการป้องกันโรคใช้เลือดออกที่ดีที่สุด